

معلومات اللقاح للعيادات المدرسية للصف السابع

لقاح المكورات السحائية ACYW

- يساعد هذا اللقاح في الحماية من أربعة أنواع من مرض المكورات السحائية.
- يمكن أن تعيش بكتيريا المكورات السحائية في خلفية أنف الشخص وحلقه دون أن تسبب له المرض.
- يمكن أن تنتشر هذه البكتيريا عن طريق التلامس المباشر مع إفرازات الفم (مشاركة الطعام والشراب وأحمر الشفاه وفرش الأسنان وزجاجات المياه و/أو الآلات الموسيقية، أو التقبيل).
- قد تكون أعراض مرض المكورات السحائية شديدة ومفاجئة للغاية، ويمكن أن تشمل الحمى والصداع وتيبس الرقبة والغثيان والقيء وأحياناً طفح جلدي أحمر مع كدمات.
- يمكن أن يسبب هذا المرض الموت وفقدان السمع وإعاقات عصبية و/أو بتر الأطراف.
- لقاح المكورات السحائية ACYW يؤخذ بجرعة واحدة، وهو إجباري لارتياذ المدرسة بموجب قانون تطعيم تلاميذ المدارس. لقاح المكورات السحائية - C (مثل مينجوغيت أو نيسفاك-سي) هو لقاح مختلف يُعطى عادة في مرحلة الطفولة المبكرة.

لقاح التهاب الكبد B

- يساعد هذا اللقاح في الوقاية من التهاب الكبد B وهو فيروس يصيب الكبد.
- يمكن أن ينتشر الفيروس من دم الشخص المصاب وسوائل جسمه عن طريق الجنس غير المحمي، أو مشاركة الإبر أو الأغراض الشخصية المستعملة (شفرات الحلاقة، قلامة الأظافر، فرش الأسنان، وما إليها)، أو ملامسة الدم أثناء الإجراءات الجراحية أو الحوادث، أو ثقب الجسم / الأذن أو الوشم بأدوات ملوثة بالعدوى. يمكن للأم المصابة أيضاً أن تنقل العدوى إلى طفلها أثناء الولادة.
- قد تشمل الأعراض: الضعف والتعب والصداع والقيء والحمى وآلام المعدة واليرقان (اصفرار لون الجلد والعينين).
- كثير من المصابين بالفيروس لا تظهر عليهم أي أعراض، لكن لا يزال بإمكانهم نشره.
- يمكن أن تستمر هذه العدوى لفترة طويلة وتؤدي إلى تلف الكبد وتليف الكبد وسرطان الكبد أو الوفاة.
- يتلقى الطلاب ما بين سن 11-15 سنة جرعتين يفصل بينهما 4-6 أشهر.

فيروس الورم الحليمي البشري (HPV)

- فيروس الورم الحليمي البشري هو طائفة من الفيروسات التي تضم أكثر من 100 نوعاً، يحمي هذا اللقاح من تسع سلالات من فيروس الورم الحليمي البشري.
- تنجم جميع سرطانات عنق الرحم تقريباً عن عدوى فيروس الورم الحليمي البشري.
- يمكن أن تسبب هذه الفيروسات أيضاً التآليل التناسلية وتغيرات في عنق الرحم وأنواع أخرى من السرطان في كل من الرجال والنساء (مثل سرطان الفرج والمهبل والشرج والقضيب والفم والحلق).
- ينتشر فيروس الورم الحليمي البشري عن طريق التلامس الجلدي عن طريق الجنس المهبلي أو الفموي أو الشرجي؛ لا يجب عليك الجماع للحصول عليه أو لنشره. قد لا يغطي الواقي الذكري جميع مناطق الجلد المصابة بالفيروس.
- سيساعد إعطاء اللقاح قبل بدء أي نشاط جنسي في منع العدوى المستقبلية بالسلالات التسع لفيروس الورم الحليمي البشري.
- يمكن للشخص أن يصاب بالفيروس دون أن تظهر عليه أي أعراض، وأن ينشره بعد ذلك.
- يمكن أن يقلل الامتناع عن النشاط الجنسي والتلامس الجلدي الوثيق من خطر الإصابة بعدوى فيروس الورم الحليمي البشري.
- جميع طلاب الصف السابع مؤهلون لتلقي هذا اللقاح، وحتى يكملوا الدراسة الثانوية. إذا فاتت طفلك هذه الفرصة، قد تكون هناك تكلفة لتلقي الجرعات المستقبلية.
- يتلقى الطلاب الذين يبدأون هذا اللقاح قبل بلوغهم سن 15 عاماً جرعتين، بفواصل 6 أشهر. إذا كان الطالب يعاني من نقص المناعة أو بدأ تلقي اللقاح بعد بلوغه 15 عاماً، فسيُزَمَّه ثلاث جرعات.

انظر خلفه لمزيد من المعلومات

من الذي يجب ألا يتلقى هذه اللقاحات؟

- أي شخص يعاني من ارتفاع في درجة الحرارة أو عدوى خطيرة في يوم العيادة (يمكنه تلقي اللقاح بمجرد أن يشعر بالتحسن)
- أي شخص لديه رد فعل تحسسي تجاه لقاح سابق، أو لديه حساسية من مكونات اللقاح، مثل:
 - اللاتكس (في لقاح ريكومبيفاكس لالتهاب الكبد ب فقط - قد يتوفر بديل خالي من اللاتكس)
 - الخميرة (في لقاحي التهاب الكبد ب وغارداسيل)
 - مكونات الدفتريا في اللقاح (لقاح ميناكتر وميدكوا في فقط)
 - تروميثامين (في لقاح نيميريكس)
- يجب على أي شخص يعاني من نقص المناعة أو يعاني من اضطراب نرفي أو امرأة حامل إخبار الممرضة قبل تلقي اللقاح

ما الذي نتوقعه بعد التطعيم:

- الاستجابات الأكثر شيوعاً هي الاحمرار، والألم، والتورم في مكان الحقن. عادة ما يكون هذا خفيفاً ويزول من تلقاء نفسه في غضون يوم إلى يومين.
- قد تستمر ردود الفعل الخفيفة مثل التعب والحمى وفقدان الشهية أو الصداع لمدة يوم أو يومين.
- في بعض الأحيان، قد يُعْمَى على الأشخاص بعد إجراءات طبية مثل تلقي اللقاحات. يمكن أن يساعد العمل على تقليل القلق وتناول شيء ما قبل التطعيم في تقليل ذلك. لا يعتبر الإغماء عرضاً جانبياً أو رد فعل لتلقي اللقاح.
- ردود الفعل التحسسية مثل الشرى أو الأزيز أو تورم الوجه والفم نادرة. في حالة حدوث هذه الأعراض، اطلب العناية الطبية على الفور.
- اتصل بمقدم الرعاية الصحية المعالج لك إذا استمرت أي أعراض لأكثر من بضعة أيام

هل لديك أسئلة؟

اتصل بممرض/ة الصحة العامة
في الوحدة الصحية في ميدلسكس- لندن
(519) 663-5317

إذا تلقى الطالب/ة أياً من هذه اللقاحات في عيادة مقدم الرعاية الصحية المعالج له،
تذكر إبلاغ الوحدة الصحية بمواعيد التطعيم.
اتبع الرابط أدناه لمزيد من المعلومات

www.healthunit.com/immunization